



## PROCESSO SELETIVO 2024

Ano Letivo de 2025

### PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

#### ENFERMAGEM



#### INSTRUÇÕES

1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
2. O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
3. A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
7. Em cada questão, há somente uma resposta correta.
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
  - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
  - b) assine no local indicado;
  - c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
  - d) não o amasse, nem dobre.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA**  
**ENFERMAGEM**

**QUESTÕES GERAIS**

01. Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Trata-se do(a):

- a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- b) Conferência de Saúde.
- c) Conselho de Saúde.
- d) Comissão Estadual Permanente de Integração Ensino-Serviço.

02. São princípios básicos do SUS, **EXCETO**:

- a) Participação da comunidade.
- b) Integralidade.
- c) Centralização.
- d) Universalização.

03. Sobre a rede de atenção às urgências, reformulada por meio da Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, é **correto** afirmar:

I - Entre os serviços que compõem a Rede de Atenção às Urgências estão: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências.

II – Entre as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências está a articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção.

III – A Atenção Domiciliar não faz parte da Rede de Atenção às Urgências, sendo um dos componentes da Política Nacional da Atenção Básica.

Estão corretas:

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

04. Sobre o disposto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é **correto** afirmar:

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.



- b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) não têm representação no Conselho Nacional de Saúde.
- d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde.

05. Quantos agentes comunitários de saúde para uma equipe estão previstos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?

- a) 4.
- b) 3.
- c) 2.
- d) Não estabelece quantidade numérica.

06. São componentes da Rede de Atenção Psicossocial, **EXCETO**:

- a) atenção básica em saúde e atenção psicossocial especializada.
- b) atenção de urgência e emergência e atenção hospitalar.
- c) atenção residencial de caráter transitório e estratégias de desinstitucionalização.
- d) reabilitação social e ambulatórios de especialidades.

07. De acordo com a Política Nacional de Humanização, são objetivos do acolhimento:

- a) Acolher e escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário.
- b) Encaminhar exclusivamente ao serviço de psicologia para identificação de riscos e vulnerabilidades do indivíduo.
- c) Prestar atendimento pontual, ainda que não seja resolutivo.
- d) O acolhimento deve ser resolutivo, ou seja, não deve resultar em encaminhamento a outros serviços.

08. Sobre a Política Nacional de Humanização, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A PNH é uma política nacional que busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores.
- b) A PNH ainda não pode ser implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde, pois não se adéqua a todas as políticas do SUS.
- c) A PNH depende da decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS para existir.
- d) A inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde pode ocorrer por meio de acolhimento, grupo de trabalho de humanização, escuta qualificada, entre outros.

09. A delimitação de objetivos é uma das etapas durante a construção de projetos de pesquisa. Leia as sentenças abaixo e assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

- ( ) Para a escrita de objetivos é preciso utilizar o verbo de ação na forma infinitiva.
- ( ) Deve-se inserir no objetivo, o lugar da pesquisa ou o território de coleta de dados.
- ( ) Na escrita do objetivo é preciso apresentar os participantes da pesquisa, ou o fato ou fenômeno a ser objeto da pesquisa.
- ( ) É possível que um projeto de pesquisa não contenha objetivo de pesquisa.



Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V,F,V,F
- b) V,V,F,F
- c) V,V,V,F
- d) F,F,V,F

10. Leia a citação a seguir e indique ao qual tipo ela se refere:

Nesse processo, a descoberta orientada, também chamada de resolução de problemas, é apenas a etapa final de uma sequência de aprendizagens, das quais “muitas já realizadas devem tê-la precedido em tempo e deve basear-se no conhecimento e na evocação de princípios que se combinam na elaboração da solução” (GAGNÉ, 1983, p. 149).

- a) Citação Indireta
- b) Citação Direta com até três linhas
- c) Citação de Citação
- d) Citação Direta com intervalos



### QUESTÕES ESPECÍFICAS

11. Considerando o Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, são atribuições privativas do enfermeiro:

- a) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- b) Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis.
- c) Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico.
- d) Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de Enfermagem e médicas.

12. Considerando o Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e o código de ética dos profissionais de enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

- I. Consiste em uma atribuição privativa do enfermeiro à direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem.
- II. É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
- III. O técnico de enfermagem assiste o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas I e II;
- d) Todas estão corretas.

13. Sobre a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 564/2017, que aprova o novo código de ética dos profissionais de enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

- I. É dever do profissional exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
- II. É direito do profissional formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha.
- III. Entre as penalidades a serem impostas pelos sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem está a suspensão do exercício profissional, que consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 60 dias.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas I e II;
- d) Todas estão corretas.

14. Sobre o diagnóstico de enfermagem, é correto afirmar:



- a) Compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde.
- b) Compreende a tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem acerca das intervenções necessárias.
- c) Compreende a coleta de dados inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas (laboratoriais e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros).
- d) Compreende o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para à pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.

15. Sobre a Resolução nº 736, de 17 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

I. A documentação do Processo de Enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe no prontuário do paciente, cabendo ao Enfermeiro o registro de todas as suas etapas, e aos membros da equipe de enfermagem a anotação de enfermagem, a checagem da prescrição e a documentação de outros registros próprios da enfermagem.

II. A quinta etapa do Processo de Enfermagem consiste na evolução de enfermagem, a qual deve conter a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais.

III. A etapa de evolução de enfermagem permite a análise e a revisão de todo o Processo de Enfermagem.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas II e III;
- d) Todas estão corretas.

16. Sobre as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, analise as afirmativas abaixo:

I. A cultura da segurança se refere a um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.

II. Segurança do paciente é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.

III. Entre as atribuições dos núcleos de segurança do paciente está a de desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço de saúde.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas.

17. Sobre o Acidente Vascular Encefálico (AVE), analise as afirmativas abaixo:



- I. Os AVE's são classificados em isquêmicos e hemorrágicos; sendo isquêmico quando ocorre obstrução de um vaso, diminuindo o fluxo de sangue para o encéfalo; e hemorrágico quando um vaso sofre ruptura.
- II. Os AVE's de artéria cerebral média geralmente provocam hemiparesia ou fraqueza unilateral, no lado corporal oposto ao AVE.
- III. Qualquer paciente que apresente déficit neurológico agudo deve ser avaliado quanto à possibilidade de AVE, seja déficit focal como a perda de força, ou difuso como a alteração do estado mental.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas.

18. Sobre a assistência de enfermagem frente aos distúrbios metabólicos, analise as afirmativas abaixo:

- I. As manifestações clínicas da hipoglicemia são produzidas, em sua maioria, pela secreção de hormônios contra reguladores, que são secretados em resposta à baixa concentração de glicose.
- II. Os sinais e sintomas de hipoglicemia podem incluir: sudorese, tremores, alteração do nível de consciência e convulsões.
- III. Entre os sintomas mais comuns estão o hálito frutado e o aumento da diurese.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas I e II;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas

19. Sobre a assistência de enfermagem frente aos distúrbios cardiovasculares, analise as afirmativas abaixo:

- I. Entre os sinais e sintomas de arritmias estão dor torácica, tonturas, batimento cardíaco irregular e dispneia.
- II. Na síndrome coronariana aguda a dor costuma ocorrer com esforços e é aliviada pelo repouso.
- III. O tamponamento cardíaco ocorre quando há acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas I e II;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas

20. Sobre a assistência de enfermagem frente ao paciente adulto em Parada Cardiorrespiratória, é correto afirmar:



- a) Durante a Reanimação Cardiopulmonar, a administração de adrenalina deve ocorrer a cada 5 a 7 minutos.
- b) Em pacientes adultos, sem via aérea avançada, a relação compressão-ventilação deve ser de 15x02.
- c) Quando o paciente estiver com via aérea avançada deve ser aplicada 1 ventilação a cada 6 segundos, com compressões torácicas contínuas.
- d) Amiodarona é uma droga recomendada em casos de Assistolia e Atividade Elétrica sem Pulso.

21. Sobre a assistência de enfermagem frente ao paciente pediátrico em Parada Cardiorrespiratória, complete a sentença abaixo, de acordo com as alternativas:

Na pediatria, quando o paciente estiver sem via aérea avançada, a relação compressão ventilação deve ser de \_\_\_\_\_. Em ritmos chocáveis de Parada Cardiorrespiratória, a carga do choque para desfibrilação deve ser de \_\_\_\_\_ no primeiro choque e \_\_\_\_\_ no segundo choque.

- a) 30x02; 200 J; 360 J;
- b) 30x02; 6 J/Kg; 10 J/kg;
- c) 15x02; 10 J/Kg; 50 J/Kg;
- d) 15x02; 2J/Kg; 4 J/Kg;

22. Sobre o atendimento ao paciente traumatizado, analise as afirmativas abaixo:

- I. As etapas para avaliação primária podem ser lembradas utilizando o mnemônico XABCDE.
- II. Na reposição volêmica, a solução de Ringer com Lactato continua sendo a solução de escolha para o manejo do choque, uma vez que sua composição é mais semelhante à composição eletrolítica do plasma sanguíneo.
- III. Embora seja importante expor o corpo de um paciente traumatizado a fim de completar uma avaliação eficaz, a hipotermia é um problema neste cenário. Assim, somente o necessário deve ser exposto no ambiente externo.

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I;
- b) Apenas I e II;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas

23. Sobre a assistência de enfermagem em saúde mental, analise as afirmativas abaixo:

- I. A internação psiquiátrica deve ser considerada um recurso de exceção, como descrito na Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes".
- II. O cuidado em saúde mental deve ser incluído no sistema de atenção da Rede de Urgências e Emergências (SAMU, Unidades de Pronto Atendimento-UPA, Pronto Socorro/PS, Hospitais Gerais-HG), com equipes orientadas conforme as diretrizes da atenção psicossocial e dos direitos humanos.
- III. Devido à gravidade e excepcionalidade da internação involuntária, é obrigatória a comunicação ao Ministério Público em até sete dias de sua ocorrência.

Está(ão) correta(s):





- a) Apenas I;
- b) Apenas I e II;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas

24. Sobre o atendimento pré-hospitalar em saúde mental, analise as afirmativas abaixo e marque V para Verdadeiro e F para Falso.

- ( ) Em casos de comportamento suicida, ter conhecimento dos principais fatores de risco não faz diferença para uma avaliação de risco precisa.
- ( ) A comunicação terapêutica é importante na abordagem. Deve ser realizada com acolhimento, empatia, escuta ativa e ausência de julgamento em relação ao paciente.
- ( ) Em casos de agressividade, na necessidade de contenção física, novas evidências mostram que é melhor que o paciente seja contido e transportado em decúbito ventral.
- ( ) O uso de contenção física de maneira inadequada pode levar a rabdomiólise.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) F; V; F; V.
- b) F; V; V; V.
- c) F; V; F; F.
- d) V; V; F; F.

25. A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre essa Portaria, analise as afirmativas abaixo e marque V para Verdadeiro e F para Falso:

- ( ) O CAPS I atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias.
- ( ) O CAPS I é indicado para Municípios com população acima de vinte mil habitantes.
- ( ) São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção de urgência e emergência o SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, entre outros.
- ( ) O CAPS II atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local.
- ( ) O CAPS II é indicado para Municípios com população acima de trinta mil habitantes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V; V; V; V; V.
- b) V; V; V; V; F.
- c) F; V; F; V; V.
- d) F; V; F; V; F.

26. De acordo com a Instrução Normativa do Calendário Nacional de vacinação 2024, assinale a alternativa correta quanto a Vacina Penta (difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada)):



- a) Administrar 2 (duas) doses, aos 2 (dois) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 120 dias entre as doses.
- b) A via de administração é a Subcutânea.
- c) O volume a ser administrado é de 1 ml.
- d) Esta vacina está contraindicada para crianças a partir de 7 (sete) anos de idade.

27. Com relação a vacina meningocócica ACWY (conjugada) – Meningo ACWY, assinale a alternativa correta:

- a) A vacina deve ser adiada em adolescentes que estejam com doenças agudas febris moderadas ou graves. Resfriados ou quadros de menor gravidade não contraindicam a vacinação.
- b) Adolescentes de 13 a 16 anos, administrar 1 (um) reforço ou 1 (uma) dose, conforme situação vacinal.
- c) Pode ser administrada simultaneamente (ou com qualquer intervalo) com outras vacinas do calendário, exceto com a Vacina adsorvida difteria e tétano adulto – dT/dupla adulto.
- d) Na rotina dos serviços de saúde, a vacina meningocócica C (conjugada) ou ACWY está indicada para gestantes e para mulheres no período de amamentação.

28. Com relação aos fatores que influenciam a resposta imune no momento da vacinação, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) No primeiro ano de vida o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Para algumas vacinas, devido à sua composição, é necessária a administração de um número maior de doses, de acordo com a idade.
- b) As gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe a possibilidade de passagem dos antígenos vivos atenuados para o feto, bem como o risco teórico de causar alguma alteração, como malformação, aborto ou trabalho de parto prematuro.
- c) Os pacientes imunodeprimidos – devido às neoplasias ou ao tratamento com quimioterapia ou radioterapia, corticóide em doses elevadas, HIV/aids – deverão ser avaliados caso a caso para a administração adequada de imunobiológicos. Em geral, os pacientes não deverão receber vacinas vivas atenuadas, mas em situação de risco epidemiológico deverá ser avaliado o benefício-risco de sua aplicação.
- d) É indicado o uso de antitérmico profilático antes da aplicação de vacinas, pois auxilia no aumento de títulos de anticorpos.

29. Paciente busca atendimento na Unidade de Saúde informando que ao vestir seus calçados sentiu uma picada e, ao verificar, identificou uma aranha marrom (*Loxosceles*). Paciente trouxe o aracnídeo em frasco de vidro e na consulta de enfermagem observa-se lesão incaracterística e ausência de comprometimento sistêmico. Qual a conduta correta:

- a) Administrar 5 ampolas EV de soro antiaracnídeo.
- b) Administrar 10 ampolas EV de soro antiaracnídeo.
- c) Tratamento sintomático. Acompanhamento de pelo menos 72 horas após a picada.
- d) Internamento imediato do paciente para acompanhamento das primeiras 24 horas.

30. Sobre a Portaria nº 1.130 de 05 de agosto de 2015 que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as sentenças abaixo:



I - A PNAISC tem por objetivo promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.

II - Para fins de atendimento em serviços de pediatria no SUS, a PNAISC contemplará crianças e adolescentes até a idade de 17 (dezessete) anos, sendo este limite etário passível de alteração de acordo com as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.

III - A PNAISC se estrutura em 7 (sete) eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde, visando à efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de forma saudável e harmoniosa, bem como a redução das vulnerabilidades e riscos para o adoecimento e outros agravos, à prevenção das doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I;
- b) Apenas II e III;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas.

31. A criança, em seu processo natural de crescimento e desenvolvimento e com seu comportamento exploratório, enfrenta situações que podem colocar em risco a sua integridade. Tais situações ocorrem conforme a fase do desenvolvimento da criança, o sexo e a faixa etária (BRASIL, 2012). Analise as sentenças abaixo e assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

- ( ) Menores de 2 anos sofrem mais atropelamentos, acidentes por submersão, quedas de lugares altos, ferimentos, lacerações e queimaduras.
- ( ) Meninas estão mais propensas a sofrer acidentes do que os meninos.
- ( ) Pré-escolares (de 2 a 6 anos) estão sujeitos a riscos impostos por terceiros, como queimaduras, intoxicações, colisão de automóvel e quedas.
- ( ) Crianças na idade escolar (de 6 a 10 anos) podem ser vítimas de atropelamentos, quedas de bicicletas, quedas de lugares altos, traumatismos dentários, ferimentos com armas de fogo e lacerações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V,V,F,F.
- b) F,F,F,V.
- c) F,F,V,V.
- d) F,V,F,V.

32. Considerando o rastreamento para criptorquidia, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Se os testículos não forem palpáveis na primeira consulta ou forem retráteis, o rastreamento deve ser realizado nas visitas rotineiras de puericultura.
- b) Se aos 6 meses não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal, deve-se realizar nova avaliação após um ano de idade.



- c) Se os testículos forem retráteis, o caso deve ser monitorado a cada 6 a 12 meses, entre os 4 e 10 anos de idade do menino, pois pode ocorrer de a criança crescer mais rápido do que o cordão espermático nessa faixa de idade e os testículos saírem da bolsa escrotal .
- d) O tratamento precoce da criptorquidia com cirurgia resulta em diminuição do risco de câncer de testículos e de problemas com a fertilidade em adultos.

33. De acordo com a Portaria nº 353 de 14 de fevereiro de 2017, que aprova as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, são recomendações em relação às estratégias e métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto:

- a) Sempre que possível deve ser oferecido à mulher a imersão em água para alívio da dor no trabalho de parto.
- b) Se uma mulher escolher técnicas de massagem durante o trabalho de parto, que tenham sido ensinadas aos seus acompanhantes, essas devem ser evitadas, pois nem todas são específicas para o trabalho de parto.
- c) Os métodos não farmacológicos de alívio da dor devem ser oferecidos à mulher após a utilização de métodos farmacológicos.
- d) A acupuntura pode ser oferecida às mulheres que desejarem usar essa técnica durante o trabalho de parto, e pode ser realizado por qualquer profissional que esteja presente no momento do trabalho de parto.

34. De acordo com as recomendações sobre o profissional que assiste ao recém-nascido logo após o parto (BRASIL, 2017), analise as sentenças abaixo:

I - O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência por profissional capacitado, médico (preferencialmente pediatra ou neonatologista) ou profissional de enfermagem (preferencialmente enfermeiro obstetra/obstetiz ou neonatal), desde o período imediatamente anterior ao parto, até que o RN seja encaminhado ao Alojamento Conjunto com sua mãe, ou à Unidade Neonatal ou ainda, no caso de nascimento em quarto de pré-parto parto e puerpério (PPP) seja mantido junto à sua mãe, sob supervisão da própria equipe profissional responsável pelo PPP.

II - Em situações onde não é possível a presença de um médico pediatra, é recomendada a presença de um profissional médico ou de enfermagem adequadamente treinado em reanimação neonatal

III - Os estabelecimentos de saúde que mantenham profissional de enfermagem habilitado em reanimação neonatal no momento do parto deverão possuir em sua equipe de retaguarda, durante 24 horas, ao menos um médico que tenha realizado treinamento teórico-prático em reanimação neonatal.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas I e III;
- d) Todas estão corretas.

35. São intervenções passíveis de serem realizadas nos casos de ingurgitamento mamário:

- a) Suspender a amamentação durante três dias.
- b) Orientar o uso de compressa quente.
- c) Proceder à massagem delicada na mama, com movimentos circulares, especialmente nas regiões endurecidas e dolorosas, no sentido de tornar o leite mais fluido.
- d) Orientar o uso de conchas.



36. Com relação à gestante de alto risco, leia as sentenças abaixo e assinale V para Verdadeiro e F para Falso.

- ( ) O compartilhamento do cuidado da gestante com a equipe da Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) poderá ocorrer em qualquer período do pré-natal, conforme estratificação de risco realizada.
- ( ) Na ocorrência de transição de cuidado da AAE para a Atenção Primária à Saúde (APS) é de extrema importância a elaboração do Plano de Cuidados da Gestante, bem como, a definição de condições que poderão determinar novo encaminhamento para avaliação e conduta da equipe da AAE e apoio matricial.
- ( ) A continuidade do cuidado é um dos princípios que deve ser garantido à gestante durante todo o ciclo gravídico puerperal. As equipes da APS e AAE devem atuar de modo independente, ou seja, um serviço não deve interferir no outro.
- ( ) As situações de urgência e emergência obstétrica requerem assistência e regulação imediata, respeitados fluxos pré definidos na APS, AAE e Atenção Hospitalar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V,V,F,V
- b) V,F,V,F
- c) F,F,V,V
- d) F,V,F,V

37. O parto pré-termo é aquele que ocorre em até 36 semanas e 6 dias de idade gestacional, excluindo o período considerado como de abortamento. Sua ocorrência é grande em todo mundo; no Brasil está em torno de 11%. São fatores de risco para o parto pré-termo:

- a) Intervalo interpartal longo (maior que 18 meses).
- b) Doença periodontal.
- c) Ser primigesta.
- d) Alto índice de massa corpórea.

38. Dados extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), apontam que as mortes relacionadas ao suicídio, no período de 2011 a 2016, foram prevalentes entre pessoas com mais de 70 anos (taxa de 8,9/100 mil habitantes). Vários fatores estão associados ao risco de suicídio, dentre eles:

- a) Doenças degenerativas que causam dependência ou sofrimentos físicos insuportáveis.
- b) Desenvolvimento de Atividades Avançadas de Vida Diária.
- c) Presença de capacidade funcional preservada.
- d) Presença de forte funcionalidade familiar.

39. A Sarcopenia é caracterizada pela presença de alterações da massa e da função muscular. São preditores da Sarcopenia, EXCETO:

- a) Perda significativa de peso não intencional.
- b) Velocidade de marcha menor ou igual a 0,8 m/s.
- c) Perímetro da panturrilha maior ou igual a 31 cm.
- d) Baixo índice de massa corporal (IMC < 22 kg/m<sup>2</sup>).



40. A população idosa atendida nos casos de urgência e emergência é bastante significativa. A celeridade no atendimento às pessoas idosas é fator determinante, considerando a necessidade de evitar a progressão para quadros mais graves e o consequente comprometimento da sua capacidade funcional. Neste sentido, analise as sentenças abaixo:

I - As causas externas estão entre as principais causas de morte entre as pessoas idosas, sendo que quedas, acidentes de trânsito, agressão física e tentativas de suicídio estão entre as mais comuns para essa população.

II - A hospitalização e o tempo de permanência em internação devem ser avaliados com bastante atenção, pois podem provocar ou agravar processos de declínio funcional na pessoa idosa.

III - Vale à pena ressaltar a importância e a possibilidade de, mesmo em situações de urgência/emergência, realizar uma avaliação integral breve da pessoa idosa. Essa avaliação auxilia na identificação das necessidades da pessoa e na definição dos serviços e pontos da rede a serem envolvidos no seu cuidado.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas a I está correta.
- b) Apenas a II está correta.
- c) Apenas a II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.



FACULDADES  
pequeno  
**PRÍNCIPE**





**GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)**

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO,  
SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	