



## PROCESSO SELETIVO 2024

Ano Letivo de 2025

### PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - ODONTOLOGIA

### INSTRUÇÕES

1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
2. O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
3. A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
7. Em cada questão, há somente uma resposta correta.
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
  - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
  - b) assine no local indicado;
  - c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
  - d) não o amasse, nem dobre.



**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA - ODONTOLOGIA**

**QUESTÕES GERAIS**

01. Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Trata-se do(a):

- a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- b) Conferência de Saúde.
- c) Conselho de Saúde.
- d) Comissão Estadual Permanente de Integração Ensino-Serviço.

02. São princípios básicos do SUS, **EXCETO**:

- a) Participação da comunidade.
- b) Integralidade.
- c) Centralização.
- d) Universalização.

03. Sobre a rede de atenção às urgências, reformulada por meio da Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, é **correto** afirmar:

I - Entre os serviços que compõem a Rede de Atenção às Urgências estão: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências.

II – Entre as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências está a articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção.

III – A Atenção Domiciliar não faz parte da Rede de Atenção às Urgências, sendo um dos componentes da Política Nacional da Atenção Básica.

Estão corretas:

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

Referência: Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011.

04. Sobre o disposto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é **correto** afirmar:

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na



formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) não têm representação no Conselho Nacional de Saúde.

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde.

05. Quantos agentes comunitários de saúde para uma equipe estão previstos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?

- a) 4.
- b) 3.
- c) 2.
- d) Não estabelece quantidade numérica.

06. São componentes da Rede de Atenção Psicossocial, **EXCETO**:

- a) atenção básica em saúde e atenção psicossocial especializada.
- b) atenção de urgência e emergência e atenção hospitalar.
- c) atenção residencial de caráter transitório e estratégias de desinstitucionalização.
- d) reabilitação social e ambulatórios de especialidades.

07. De acordo com a Política Nacional de Humanização, são objetivos do acolhimento:

- a) Acolher e escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário.
- b) Encaminhar exclusivamente ao serviço de psicologia para identificação de riscos e vulnerabilidades do indivíduo.
- c) Prestar atendimento pontual, ainda que não seja resolutivo.
- d) O acolhimento deve ser resolutivo, ou seja, não deve resultar em encaminhamento a outros serviços.

08. Sobre a Política Nacional de Humanização, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A PNH é uma política nacional que busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores.
- b) A PNH ainda não pode ser implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde, pois não se adéqua a todas as políticas do SUS.
- c) A PNH depende da decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS para existir.
- d) A inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde pode ocorrer por meio de acolhimento, grupo de trabalho de humanização, escuta qualificada, entre outros.

09. A delimitação de objetivos é uma das etapas durante a construção de projetos de pesquisa. Leia as sentenças abaixo e assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

- ( ) Para a escrita de objetivos é preciso utilizar o verbo de ação na forma infinitiva.
- ( ) Deve-se inserir no objetivo, o lugar da pesquisa ou o território de coleta de dados.



- ( ) Na escrita do objetivo é preciso apresentar os participantes da pesquisa, ou o fato ou fenômeno a ser objeto da pesquisa.
- ( ) É possível que um projeto de pesquisa não contenha objetivo de pesquisa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) V,F,V,F  
b) V,V,F,F  
c) V,V,V,F  
d) F,F,V,F

10. Leia a citação a seguir e indique ao qual tipo ela se refere:

Nesse processo, a descoberta orientada, também chamada de resolução de problemas, é apenas a etapa final de uma sequência de aprendizagens, das quais “muitas já realizadas devem tê-la precedido em tempo e deve basear-se no conhecimento e na evocação de princípios que se combinam na elaboração da solução” (GAGNÉ, 1983, p. 149).

- a) Citação Indireta  
b) Citação Direta com até três linhas  
c) Citação de Citação  
d) Citação Direta com intervalos



### QUESTÕES ESPECÍFICAS

11. O Brasil Sorridente apresenta como principais linhas de ação:

I - A reorganização da Atenção Básica (especialmente por meio das equipes de Saúde Bucal – eSB – da Estratégia Saúde da Família).

II - Atenção Especializada ambulatorial (por meio da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias).

III - A adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público.

IV - Vigilância em saúde bucal.

Estão corretas somente:

- a) I e III
- b) II e III
- c) II e IV
- d) Todas estão corretas.

12. As Conferências de Saúde são destinadas a propor e avaliar políticas de saúde instituídas pela Lei nº 8142/90. Além das Conferências de Saúde existem conferências temáticas dentro da saúde, como por exemplo, as Conferências Nacionais de Saúde Bucal. Até o ano de 2024 foram realizadas quantas Conferências Nacionais de Saúde Bucal?

- a) Duas
- b) Três
- c) Nove
- d) Dezesesseis

13. O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) foi introduzido na década de 1980 por Jo E. Frencken, como parte de um programa de saúde bucal na Tanzânia. Para realizar o Tratamento Restaurador Atraumático é necessário o uso de:

- a) Isolamento absoluto
- b) Anestesia local
- c) Uso de curetas de dentina
- d) Restaurações de Amálgama.

14. Segundo o Manual de boas práticas em biossegurança para ambientes odontológicos (CFO, 2020) o momento crítico que tem potencial para gerar a contaminação do profissional de saúde é no (a):

- a) Processo de esterilização dos instrumentais.
- b) Etapa de paramentação dos Equipamentos Individuais de Paramentações (EPIs).
- c) Etapa de desparamentação dos Equipamentos Individuais de Paramentações (EPIs).
- d) Processo de lavagem prévia das mãos.

15. A utilização de bochechos com abrangência universal com periodicidade semanal (NAF 0,2%) é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações:



- I - Exposição à água de abastecimento sem flúor.
- II - Exposição à água de abastecimento com teores de fluoretos abaixo da concentração indicada (até 0,54 ppm F).
- III - CPOD médio maior que 3 aos 12 anos de idade; menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade.
- IV - Populações com condições sociais e econômicas que indiquem baixa exposição a dentifrícios fluoretados.

São corretas somente:

- a) I e II.
- b) II e III
- c) I e IV
- d) Todas estão corretas.

16. O dente de Turner é um defeito que pode variar de áreas focais de coloração branca, amarela ou marrom até extensa hipoplasia que pode envolver toda a coroa de um dente permanente. Uma das etiologias desta patologia é:

- a) Presença de Infecção por Herpes Virus na amelogênese do dente permanente.
- b) Decorrente de doença inflamatória periapical dos dentes decíduos sobrejacentes.
- c) Uma consequência de fatores sistêmicos, como a febre exantemática, que ocorre durante os dois primeiros anos de vida.
- d) O uso da radioterapia ou quimioterapia nas terapias para tratamento de câncer pediátrico.

17. Considerando o Código de Ética Odontológica (CFO, 2012) é dever fundamental dos inscritos:

- a) Elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais.
- b) Realizar atos que impliquem mercantilização da Odontologia ou sua má conceituação.
- c) Exercer a profissão mantendo comportamento indecoroso.
- d) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, somente ao exercer a profissão no setor público.

18. A polarização da cárie é:

- a) Quando ocorrem modificações na estrutura mineral do dente durante a amelogênese.
- b) Quando ocorrem modificações na distribuição da cárie na cavidade oral, com prevalência em dentes anteriores.
- c) Quando a maior quantidade de cavidades de cárie se concentra na maioria das crianças.
- d) Alteração no padrão da doença cárie, com índices elevados em alguns grupos populacionais.

19. São benefícios da amamentação:

- I – A correta maturação e o crescimento das estruturas orais.
- II – Favorece um padrão de respiração com predominância nasal.
- III – Desenvolvimento do perfeito desequilíbrio neuromuscular.
- IV – Correto desenvolvimento da articulação temporomandibular.

Estão corretas somente:



- a) I e II
- b) II e III
- c) I, II e IV
- d) Todas estão corretas

20. As formas clínicas da Candidíase Oral são:

- I – Quelite angular.
- II – Eritematosa.
- III – Pseudomembranosa.
- IV – Pseudohiperplásica.

Estão corretas somente:

- a) I e III
- b) I e II
- c) I, II e III.
- d) Todas estão corretas

21. As aplicações tópicas de flúor como método preventivo de cárie promovem:

- a) Aumento da concentração de Flúor na cavidade bucal para interferir no processo de des e remineralização.
- b) Fluorose dentária grave independente da concentração e método utilizado.
- c) Alterações do pH crítico para 5,5 e com isso, o ponto de desmineralização do dente.
- d) Intoxicações agudas sempre que houver exposição a uma concentração de 0,7 mg de flúor por litro.

22. Cárie recorrente é uma lesão de cárie que:

- a) Ocorre principalmente nas raízes dos dentes molares.
- b) Se desenvolve em superfícies dentárias intactas.
- c) Se desenvolve em uma superfície dentária adjacente a uma restauração.
- d) Ocorre principalmente em superfícies dentárias livres.

23. Fenômeno de extravasamento de muco também é conhecido por:

- a) Cisto Periapical.
- b) Ceratocisto.
- c) Mucocele.
- d) Fibroma.

24. Em relação à doença periodontal, são fatores de risco:

- I – Tabagismo.
- II – Doenças metabólicas (diabetes e hipertensão).
- III – Controle adequado de biofilme.
- IV – Imunodepressão e estresse.



São verdadeiras somente:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e IV

25. Segundo o Guia de Recomendações para o Uso de Fluoretos no Brasil do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) o teor ideal de concentração de flúor na água de abastecimento na maior parte da Região Sul do Brasil é:

- a) 0,03 ppm.
- b) 0,05 ppm.
- c) 0,08 ppm.
- d) 0,10 ppm

26. Em relação aos decíduos:

- a) O esmalte dos dentes decíduos tem coloração mais escura e mais opaca do que a dos dentes permanentes.
- b) As raízes dos dentes decíduos são menores, mais delgadas e mais claras que as dos dentes permanentes.
- c) O esmalte dos dentes decíduos é mais permeável e menos desgastado que o esmalte dos dentes permanentes.
- d) Nos dentes decíduos, há mais estrutura dentária para proteger a polpa do que nos dentes permanentes.

27. São cistos odontogênicos de desenvolvimento:

- a) Queratocisto, primordial e radicular.
- b) Residual, folicular e periodontal lateral.
- c) Dentígero, de erupção e gengival do recém-nascido.
- d) Residual, radicular e queratocisto.

28. O Diamino Fluoreto de Prata (DPT) tem sido utilizado no Brasil desde os anos de 1980, mas houve um interesse renovado deste produto com a liberação de seu uso para sensibilidade dentinária e *off label* no tratamento de cáries nos Estados Unidos em 2014 e no Canadá em 2017. Em relação ao DPT:

- a) O manejo das lesões de cárie com DPT é um procedimento complexo, invasivo que gera dor na sua aplicação.
- b) Está indicado especialmente para crianças pequenas e não colaborativas.
- c) Uma dificuldade para o uso de DPT é que ele exige isolamento absoluto.
- d) O uso em idosos é contraindicado pelo risco de intoxicação.

29. Sobre as técnicas de escovação dentária podemos afirmar que:

- a) A técnica de Bass Modificada é a mais recomendada para pacientes com perda de inserção, por permitir a limpeza do sulco gengival.
- b) A técnica de Fones a escova é movimentada no sentido de vai e vem anteroposterior, em todas as faces livres.





- c) A técnica horizontal preconiza a realização de movimentos circulares nas faces vestibulares e palatinas/linguais dos dentes.
- d) A técnica de Stillman Modificada tem por objetivo favorecer a inserção das cerdas da escova em áreas onde há espaço interdental significativo.

30. Em relação ao uso de Fluoretos para prevenção à cárie dentária a Dose Provavelmente Tóxica (DPT) é:

- a) 0,05 mgF/kg
- b) 5,0 mgF/kg
- c) 8 e 16 mgF/kg
- d) 32 a 64 mgF/kg

31. Os incisivos de Hutchinson são um quadro bem conhecido de infecção por sífilis:

- a) Primária.
- b) Secundária.
- c) Terciária.
- d) Congênita.

32. Sobre o índice CPO (Klein e Palmer, 1937) podemos afirmar que:

- a) É um índice em desuso, em razão da dificuldade de estabelecer comparações entre nacionalidades.
- b) O componente P significa “perdido” em razão de avulsões.
- c) O componente C significa “cariado” nas dentições decíduas.
- d) O componente O significa “obturado” que pode representar acesso a serviços odontológicos.

33. Em relação à Fluorterapia para paciente com atividade de cárie podemos afirmar que:

- I- Crianças de 0 a 4 anos devem utilizar creme dental com flúor três vezes ao dia e a quantidade de creme dental deve ser do tamanho de um grão de arroz.
- II- Crianças de 6 anos ou mais não está recomendado o uso de bochecho com flúor a 0,05%.
- III- Para crianças de 0 a 4 anos se indica o uso de verniz fluoretado nos dentes todos os meses
- IV- Para crianças de 5 anos ou mais recomenda-se o gel fluoretado 0,2% semanal por pelo menos dois anos.

Estão corretas as alternativas:

- a) Somente I
- b) Somente II
- c) I e III
- d) II e IV

34. A atenção à saúde bucal deve ser parte integrante do cuidado pré-natal, dado o reconhecido impacto dela na saúde geral. Melhorar a condição de saúde bucal durante a gravidez pode otimizar não somente a saúde geral da mulher, mas também contribuir na saúde do bebê. O melhor período gestacional para o atendimento odontológico é:

- a) No primeiro trimestre.



- b) No segundo trimestre.
- c) No terceiro trimestre.
- d) Após o nascimento do bebê.

35. O índice de Dean (1934) é utilizado para mensurar:

- a) Gengivites localizadas.
- b) Bolsas Periodontais.
- c) Fluorose dentária.
- d) Traumatismos dentários.

36. Anomalias morfológicas são as alterações de forma dos elementos dentários. Sobre as anomalias morfológicas podemos dizer que:

- a) A geminação ocorre quando os dentes estão unidos pelo cimento.
- b) A fusão é uma tentativa de união de dois germes dentários.
- c) Dens in dente representa uma comunicação com a cavidade pulpar.
- d) A concrecência é a tentativa de bipartição de um germe dentário.

37. O usuário pode buscar o cuidado em saúde bucal, um procedimento, uma orientação, uma atividade de grupo ou uma consulta, na forma de demanda espontânea ou programada. Demanda programada:

- a) Permite a melhor organização da agenda das equipes de saúde bucal, do processo de trabalho com agendamento de diferentes tipos de consultas e das rotinas diárias do usuário.
- b) É a busca do usuário à unidade, independentemente do motivo ou do tempo de evolução do problema, de forma natural e não esperada pelo serviço.
- c) É o atendimento prestado a pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizações de patologias crônicas que são acolhidos nas UBS, sem agendamento prévio.
- d) Atende principalmente dor de dente, trauma bucodentoalveolar, abscesso bucal, agudização de condições crônicas, entre outras, por procura espontânea do usuário

38. Usuário procura a Unidade de Saúde com queixa de aumento de volume ao longo da superfície lingual da mandíbula acima da linha miloióidea, na região de pré-molares, bilateral. Relata que não nunca teve dor e que sempre teve esse aumento de volume, mas que ficou com medo depois que um colega teve câncer de boca. Ao exame clínico observou-se uma massa nodular única, firme à palpação (consistência óssea), mucosa com a coloração normal, dentes com vitalidade e sem sinais de lesões periodontais. O Diagnóstico mais provável é:

- a) Rânula
- b) Varicoses
- c) Tórus Mandibular
- d) Leucoplasia.

39. A causa do carcinoma epidermoide é multifatorial. Nenhum agente ou fator (carcinógeno) etiológico único tem sido definido ou aceito, porém tanto fatores extrínsecos quanto intrínsecos podem estar atuando. São fatores extrínsecos:

- a) Fumo e álcool.
- b) HIV e desnutrição



- c) Infecção bacteriana e anemia por deficiência de ferro.
- d) Infecção por protozoários e sífilis.

40. O carcinoma epidermoide de boca tem uma apresentação clínica variada, incluindo as seguintes:

- I - Exofítica (aumento de volume; vegetante, papilífera, verruciforme)
- II - Endofítica (invasiva, escavada, ulcerada)
- III - Leucoplásica (mancha branca)
- IV - Eritroplásica (mancha vermelha)

Estão corretas somente:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e IV
- d) Todas estão c





**GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)**

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	